予　防　接　種

予防接種の内容に変更や追加があったときは、町ホームページ等でお知らせします。

予防接種のスケジュールは、それぞれの予防接種の望ましい接種時期の例を示しています。実際に接種する予防接種のスケジュールについては、かかりつけ医等に相談しながら進めてください。

妊婦の定期予防接種 NEW

ワクチン名	回数	費用	対象者	効果	
RSウイルス母子免疫ワクチン 不活化ワクチン	1回	無料	妊娠28週0日から36週6日の妊婦	妊婦が接種することで、胎盤を通して胎児に抗体が移行し、乳児のRSウイルスを原因とする下気道疾患（気管支炎や肺炎）を予防します。	持ち物、接種医療機関等の詳細は町ホームページをご覧ください。

子どもの定期予防接種

●**自己負担**：無料　（ただし、対象年齢を過ぎると有料になります）
●**持　ち　物**：母子健康手帳、予診票、保護者の身分証明書

ワクチン名	対象年齢	回数	標準的な接種期間
B型肝炎 不活化ワクチン	1歳の誕生日の前日まで	3回	初回：生後2か月から27日以上の間隔をあけて接種（2回） 追加：1回目の注射から139日以上の間隔をあけて接種
ロタウイルス（飲むワクチン） 経口生ワクチン	ロタリックス（1価）：生後6週～生後24週まで	2回	生後2か月から出生14週6日後までの間27日以上の間隔をあけて接種
	ロタテック（5価）：生後6週～生後32週まで	3回	
小児用肺炎球菌 不活化ワクチン	生後2か月～5歳の誕生日前日まで	4回	初回：生後2か月から生後7か月までの間に27日以上の間隔を開けて接種（3回） 追加：初回接種終了後60日以上の間をおいて12か月から15か月までの間
五種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ） 不活化ワクチン	1期：生後2か月～7歳6か月の前日まで	4回	第1期初回：生後2か月から生後7か月までに開始し、20日から56日までの間隔をおいて接種（3回） 第1期追加：第1期初回接種（3回）終了後、6か月から18か月までの間隔をあけて接種（1回）
BCG（結核） 注射生ワクチン	1歳の誕生日の前日まで	1回	生後5か月から生後8か月までの間
麻しん・風しん混合（MR） 注射生ワクチン	1期：1歳～2歳の誕生日の前日まで 2期：小学校就学前年の4月1日～3月31日	2回	
水　痘（みずぼうそう） 注射生ワクチン	1歳～3歳の誕生日の前日まで	2回	1回目：1歳から15か月の間 2回目：1回目終了後6か月から12か月までの間
日本脳炎 不活化ワクチン	1期：生後6か月～7歳6か月になる前日まで	2回	1期初回：3歳から4歳までの間に6日から28日の間隔をあけて接種
		1回	1期追加：4歳から5歳までの間



：定期接種の対象期間　　：標準的な接種期間