


新型コロナワクチン

3回目接種（追加接種）のご案内

町では国の指示に基づき、2月1日から65歳以上の高齢者を対象に、3回目接種（追加接種）を行っています。
3月1日からは64歳以下の方を対象に、モデルナ社製ワクチンを用いた前倒し接種が始まります。1・2回目接種を終えた方へ、順次接種券をお送りしますので、接種を希望される方はご予約のうえ、接種をお受けください。

3回目接種スケジュール

◆令和3年7月31日までに2回目接種を終えた方



対象者	接種券発送	予約開始	接種開始
65歳以上の方 （ご自身で予約される方）	1月21日発送済み	2月21日（月） 9時～	予約時に ご確認ください
64歳以下の方	2月14日（月）の週		3月1日（火）以降

◆令和3年8月1日以降に2回目接種を終えた方

- ・接種券発送：2月28日（月）以降順次
- ・予約開始：接種券が届き次第

接種会場

● 集団接種

会場：コミュニティセンター進修館
使用ワクチン：ファイザー・モデルナ
接種日：火～日曜日（月・祝日は除く）

● 個別接種

会場：町内協力医療機関
※詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。
使用ワクチン：モデルナ
接種日：各医療機関指定日

！ 接種会場へは「接種券・予診票」、
「本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）」をお持ちください。

武田/モデルナ社製ワクチンの接種にご協力ください

64歳以下の3回目接種では、モデルナ社製ワクチンが多く供給される見込みです。多くの方に7ヶ月間隔で接種いただくために、モデルナ社製ワクチンの積極的な接種をご検討ください。※裏面にモデルナ社製ワクチンに関する厚生労働省のリーフレットを掲載しております。

64歳以下で9月30日までに 2回目接種を終えた方の人数	供給が決定している ワクチン数（時期未定）	
	ファイザー	モデルナ
およそ14,700人 （医療従事者等含む）	3,510人分	9,600人分

予約方法 ※予約には「接種券」が必要です

3回目接種の予約は、2回目接種から7か月以上経過した日付以降です。※変更となる場合があります。

①LINE予約



②Web予約



③予約専用ダイヤル
（祝日を除く9時～17時）
0120・056・732

● 大規模接種会場

会場：東京都：大手町、埼玉県：浦和
使用ワクチン：モデルナ

※接種をお急ぎの方は大規模接種センターでの接種もご検討ください。予約方法などは各大規模接種会場のホームページをご覧ください。

武田/モデルナ社製ワクチンの安全性と効果について



◎使用するワクチン

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。ファイザー社は1・2回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社は半量になります。

◎1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチン（※）を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

（※）武田 / モデルナ社ワクチンは、3回目は 50 μ g 接種することになっているが、本研究では 100 μ g 接種した結果が報告されている。

ワクチンの組み合わせ	抗体価
ファイザー → ファイザー → モデルナ	抗体価は 上昇
ファイザー → ファイザー → ファイザー	

出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果（※）が維持されています。

ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防（※）の効果が有意に高かったと報告されています。

（※）重症化予防には入院予防を含む

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

よくあるご質問

Q. 武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A. 武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。

（注）接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。出典：特例承認に係る報告書より

Q. ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A. 1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果（※）が維持されています。

ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防（※）の効果が有意に高かったと報告されています。

（※）重症化予防には入院予防を含む

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

◆ 1・2回目接種と3回目接種で異なるワクチンを接種する交接種や、モデルナ社製ワクチンの副反応についての問合せ窓口

厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター 0120・761・770（9時～21時）