

# イネカメムシを 防除しましょう！！



各地でイネカメムシが発生しています。不稔及び斑点米を防ぐためには、**出穂期～穂揃期と、その7～10日後の薬剤散布**が有効です。適期防除を実施しましょう。

## 1回目防除 不稔の防止・低減

出穂期～穂揃期に必ず薬剤散布を行う。  
粒剤では処理を数日早める。

## 2回目防除 斑点米の防止・低減

穂揃期の7～10日後に薬剤散布を行う。  
粒剤では処理を数日早める。



株内の茎のうち約半数～8割程度が出穂した頃



穂が上部から傾き、籾が厚くなり始めた頃

田植時期	品種	1回目防除	2回目防除
4月下旬 ～5月上旬	彩のきずな、コシヒカリ	7月中旬～下旬	8月上旬～中旬
	彩のかがやき	8月上旬	8月中旬～下旬
5月中下旬	彩のきずな、コシヒカリ	7月下旬～8月上旬	8月中旬～下旬
	彩のかがやき	8月上旬～中旬	8月中旬～下旬
6月上旬	彩のきずな、コシヒカリ	8月上旬	8月中旬～下旬
	彩のかがやき	8月中旬	8月下旬～9月上旬
6月中下旬	彩のきずな	8月中旬～下旬	8月下旬～9月上旬
	彩のかがやき	8月下旬	9月上旬～中旬

### 使用可能な薬剤の例

(令和6年6月26日時点の登録情報)  
農薬はラベルに記載の適用作物、使用時期、使用方法等を十分確認の上、最終有効期限までに使用してください。

商品名	IRACコード	倍数・処理量	使用時期・回数
スタークル液剤10	4A	1,000倍	収穫7日前まで・3回以内*
キラップフロアブル	2B	1,000～2,000倍	収穫14日前まで・2回以内*
トレボン乳剤	3A	2,000倍	収穫14日前まで・3回以内
スタークル豆つぶ	4A	250g/10a	収穫7日前まで・3回以内*
キラップ粒剤	2B	3kg/10a	収穫14日前まで・2回以内*

\*「スタークル液剤10」「スタークル豆つぶ」について、ジノテフランの総使用回数は4回以内、  
「キラップフロアブル」「キラップ粒剤」について、エチプロールの総使用回数は2回以内のため、注意してください。

本虫に係る相談については、お近くの県農林振興センターか以下のいずれかに御連絡ください。  
埼玉県病害虫防除所 電話:048-539-0661 埼玉県農産物安全課 電話:048-830-4053